

INOCULANTE DE SILAJE · LÍNEA ANIMAL

SiloFeed

Fermentación dirigida desde el primer día.


DOSIS DE REFERENCIA
0,2 L/t
☐ Fabricación nacional

☐ Bidón de 20 L para 100 t

☐ 200 ml de producto vivo por tonelada

Qué es

Un inoculante vivo de bacterias ácido lácticas (*Lactobacillus*) que se aplica al armar el silo y dirige la fermentación desde el principio, en lugar de dejarla librada al azar.

Por qué funciona

Fermenta rápido Fermenta rápido los azúcares del forraje y produce ácido láctico.	Baja el pH en poco tiempo Con pH bajo se inhiben hongos, levaduras y clostridios, y se conservan la energía y la proteína del material.	Menos pérdidas invisibles Materia seca, energía y proteína que hoy se van sin que nadie las mida; menos calentamiento al abrir.
Silo estable, rumen estable Silo más palatable y más digestible: mejor conversión y más litros o más kilos.	Dosis de producto vivo 200 ml de producto vivo por tonelada, frente a 5 a 10 gramos de un inoculante químico.	

Qué esperar

Cada cifra declara su nivel de evidencia

26 a 28 °C

Temperatura estable en silos inoculados, sin quema de azúcar

OBSERVACIÓN DE CAMPO
100 t de silo

Por bidón de 20 L: 200 ml de producto vivo por tonelada

DATO DE FICHA TÉCNICA


Dónde y cómo se aplica

SISTEMA	DOSIS	FORMA DE APLICACIÓN
Silo	200 mL/t	Durante el picado y el armado
Presentación	Bidón de 20 L	Alcanza para 100 t de silo bolsa

Producto biológico vivo: viabilidad de seis meses desde la fabricación. Agua sin cloro o reposada 12 horas para la dilución.

El caso detrás de cada cifra

Rubro, zona y escala; nunca el nombre del productor

OBSERVACIÓN DE CAMPO Silos inoculados: temperatura estable de 26 a 28 grados

Sin quema de azúcar, sin olor y sin calentamiento de un día para el otro. La cara de corte, sin hongo y sin material caliente, es la prueba más directa. Es observación de campo.

OBSERVACIÓN DE CAMPO Tambos: menos grano en la ración con la misma producción

En tambos que lo usan se observó que hace falta menos proporción de grano en la ración manteniendo la producción.

Ficha técnica

Formato	Bidón de 20 L (100 t de silo bolsa)
Base	Bacterias ácido lácticas (Lactobacillus) vivas
Materiales	Maíz, sorgo, pasturas, grano entero, húmedo o picado, y henificación
Viabilidad	6 meses desde la fabricación
Conservación	A la sombra, fresco, sin sol directo
Origen	Fabricado en Paraguay

Se combina con

MicroFeed

El probiótico que estabiliza el rumen que recibe ese silo.

CarboFeed

El carbono de la ración que adsorbe toxinas y transporta la microbiología al rumen.



SIGUIENTE PASO

Pedir cotización o hablar con nuestro equipo técnico

Respuesta del equipo técnico en menos de 24 h hábiles. Definimos dosis y protocolo sobre la ración y el manejo de su establecimiento.

+595 981 504810 · ventas@bloom.com.py · bloom.com.py
Asunción · Loma Plata · Mcal. Estigarribia · Caaguazú

Antes de dosificar, analice su agua

La dureza, la salinidad y el cloro del agua de bebida afectan la eficacia de los biológicos. En el Chaco el análisis de agua es protocolo obligatorio.

Solicitar análisis de agua →