

INOCULANTE DE SILAGEM · LINHA ANIMAL

SiloFeed

Fermentação dirigida desde o primeiro dia.

DOSE DE REFERÊNCIA

0,2 L/t

☐ Fabricação nacional

☐ Galão de 20 L para 100 t

☐ 200 ml de produto vivo por tonelada

O que é

Um inoculante vivo de bactérias ácido-láticas (*Lactobacillus*) que se aplica na montagem do silo e dirige a fermentação desde o princípio, em vez de deixá-la ao acaso.

Por que funciona

Fermenta rápido

Fermenta rápido os açúcares da forragem e produz ácido láctico.

Baixa o pH em pouco tempo

Com pH baixo inibem-se fungos, leveduras e clostrídios, e conservam-se a energia e a proteína do material.

Menos perdas invisíveis

Matéria seca, energia e proteína que hoje se vão sem que ninguém as veja; menos aquecimento na abertura.

Silo estável, rúmen estável

Silagem mais palatável e mais digestível: melhor conversão e mais litros ou mais quilos.

Dose de produto vivo

200 ml de produto vivo por tonelada, frente a 5 a 10 gramas de um inoculante químico.

O que esperar

Cada número declara seu nível de evidência

26 a 28 °C

Temperatura estável em silos inoculados, sem queima de açúcar

OBSERVAÇÃO DE CAMPO

100 t de silagem

Por galão de 20 L: 200 ml de produto vivo por tonelada

DADO DE FICHA TÉCNICA



Onde e como se aplica

SISTEMA	DOSE	FORMA DE APLICAÇÃO
Silo	200 mL/t	Durante a picagem e a montagem
Apresentação	Galão de 20 L	Suficiente para 100 t de silo bolsa

Produto biológico vivo: viabilidade de seis meses desde a fabricação. Água sem cloro ou em repouso por 12 horas para a diluição.

O caso por trás de cada número

Setor, região e escala; nunca o nome do produtor

OBSERVAÇÃO DE CAMPO Silos inoculados: temperatura estável de 26 a 28 graus

Sem queima de açúcar, sem odor e sem aquecimento de um dia para o outro. O painel de corte, sem fungo e sem material quente, é a prova mais direta. É observação de campo.

OBSERVAÇÃO DE CAMPO Laticínios: menos grão na ração com a mesma produção

Em laticínios que o usam observou-se que é necessária menor proporção de grão na ração mantendo a produção.

Ficha técnica

Formato	Galão de 20 L (100 t de silo bolsa)
Base	Bactérias ácido-láticas (Lactobacillus) vivas
Materiais	Milho, sorgo, pastagens, grão inteiro, úmido ou picado, e fenação
Viabilidade	6 meses desde a fabricação
Conservação	Na sombra, em ambiente fresco, sem sol direto
Origem	Fabricado no Paraguai

Combina com

MicroFeed

O probiótico que estabiliza o rúmen que recebe essa silagem.

CarboFeed

O carbono da ração que adsorve toxinas e transporta a microbiologia ao rúmen.



PRÓXIMO PASSO

Solicitar orçamento ou falar com nossa equipe técnica

Resposta da equipe técnica em menos de 24 h úteis. Definimos dose e protocolo com base na ração e no manejo do seu estabelecimento.

+595 981 504810 · ventas@bloom.com.py · bloom.com.py
Asunción · Loma Plata · Mcal. Estigarribia · Caaguazú

Antes de dosificar, analise sua água

A dureza, a salinidade e o cloro da água de bebida afetam a eficácia dos biológicos. No Chaco a análise de água é protocolo obrigatório.

Solicitar análise de água →